



**KEMİRGEN
İSTASYONLARINI
YERLEŐTİRMEDEN
ÖNCE...**



Başarılı bir vektör mücadelesinin ilk adımı hedef zararlıyı tanımlamaktır. Bu konuda yürüyen ve uçan haşereler için zaman ayırırken kemirgenler söz konusu olduğunda bu adım genellikle gözden kaçırılır. Ortamda kemirgen bulunduğu dair kanıtları keşfettiğimizde, otomatik olarak istasyonlara rodentisit koyarak mücadele eder ve sonucun iyi olmasını umarız. Ancak üç ana ortak kemirgen- Norveç sıçanı (*Rattus norvegicus*), Çatı sıçanı, (*Rattus rattus*), Ev faresi (*Mus musculus*)- davranışlarında ve tercihlerinde önemli farklılıklara sahiptir ve bunları göz önüne alarak mücadele etmemiz gerekir.

Sıçanlar genellikle sonbahar yaklaşırken yemek ve barınmak için binalara girerler, yuvalama ve beslenme alanları farklı yerlerde ve gıda aramak için dışarı çıkarlar. Neofobik bir canlıdır, yeni gıda kaynağına alışması zaman alır.

Ülkemizdeki en baskın sıçan türü olan Norveç sıçanı yaşamlarını çoğunlukla zeminde geçirirken Çatı sıçanı ise tavan arasında ve binanın yüksek bölümlerini tercih eder. Bu nedenle çatı sıçan ile mücadele ederken zemine konulan yemler işe yaramayabilir.

Sıçanlar yemler konusunda seçicidirler ve olumsuz bir tecrübe yem çekingenliği geliştirebilir. Önemli farklılıklarından birisi sıçanlar ayrı bir su kaynağına ihtiyaç duyarken fareler yediği besinlerden (özellikle domates ve salatalık fareler için cezbedici besinlerdir) su ihtiyacını giderebilmektedir. Sıçanları su ve emin olduğu gıda kaynakları yakınlarında bulabilirsiniz.

Fareler ise , sıçanların aksine yaşamlarının büyük bölümünü iç mekanlarda ve yerden yüksekte geçirir. Yine sıçanlardan farklı olarak, çok meraklı bir yapıya sahiptir ve gıda aramak için aynı gecede çok sayıda besin kaynağı arasında dolaşabilir.

Tanımlama, mücadelenin ilk ve önemli adımıdır. Doğru stratejiler ile başarılı bir kemirgen mücadelesinin anahtarıdır.



roksan
İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.